

中华人民共和国农业部公告

第 2629 号

根据《兽药管理条例》规定,我部组织制定了犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病四联活疫苗试行规程、质量标准、说明书和标签,现予发布,自发布之日起执行。

特此公告。

附件:1. 兽药标准目录

2. 试行规程

3. 质量标准

4. 说明书和标签

农 业 部

2017 年 12 月 25 日

附件 1

兽药标准目录

序号	产品名称	标准制定单位
1	犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病四联活疫苗	中国人民解放军军事医学科学院军事兽医研究所

附件 2（略）

附件 3（略）

附件 4

犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病四联活疫苗 说明书和标签

一、犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病四联活疫苗说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病四联活疫苗

商品名称：无

英文名称：Canine Distemper, Parainfluenza, Adenovirus and Parvovirus Vaccine for Dogs, Live

汉语拼音：Quanwenre, Quanfuliugan, Quanxianbingdu Yu Quanxixiaobingdubing Silian Huoyimiao

【主要成分与含量】每头份含犬瘟热弱毒（CDV/R-20/8 株）、犬副流感弱毒（CPIV/A-20/8 株）、犬腺病毒弱毒（YCA18 株）和犬细小病毒弱毒（CR86106 株）均在 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 以上。

【性状】微黄白色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后，迅速溶解成粉红色澄清液体。

【作用与用途】用于预防犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病。免疫期为 12 个月。

【用法与用量】肌肉注射。用注射用水稀释成每头份 2.0ml。对断奶幼犬以 21 日的间隔连续接种 3 次，每次 2.0ml；对成犬每年接种 2 次，间隔 21 日，每次 2.0ml。

【注意事项】

（1）仅用于非食用犬的预防接种，不能用于已发生疫情时的紧急接种与治疗。孕犬禁用。

（2）使用过免疫血清的犬，需隔 7~14 日后再接种本疫苗。

（3）使用无菌注射器具进行接种。

（4）稀释后，应立即注射。

（5）接种期间应避免调动、运输和饲养管理条件骤变，并禁止与病犬接触。

（6）接种后，如发生过敏反应，应立即肌肉注射盐酸肾上腺素注射液 0.5~1.0ml。

（7）用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】1 头份/瓶

【包装】15 瓶/盒

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为9个月；-20℃以下保存，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

二、犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病四联活疫苗

标签

兽用

犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病四联活疫苗

1 头份/瓶

批准文号：

批 号：

有效期至：

【作用与用途】用于预防犬瘟热、犬副流感、犬腺病毒与犬细小病毒病。免疫期为12个月。

【用法与用量】肌肉注射。用注射用水稀释成每头份2.0ml。对断奶幼犬以21日的间隔连续接种3次，每次2.0ml；对成犬每年接种2次，间隔21日，每次2.0ml。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为9个月；-20℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用